

表3 抗インフルエンザ薬の投与時期と胎児・新生児異常との関連

	タミフル 投与例		リレンザ 投与例		抗インフルエンザ薬 以外の薬剤		タミフル・リレンザ 投与症例		治療薬剤なし		投与薬不明	
	対象 患者数	胎児・ 新生児 異常	対象 患者数	胎児・ 新生児 異常	対象 患者数	胎児・ 新生児 異常	対象 患者数	胎児・ 新生児 異常	対象 患者数	胎児・ 新生児 異常	対象患 者数	胎児・ 新生児 異常
妊娠初期												
無影響期(0-3週)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
絶対過敏期(4-7週)	59	10	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0
相対過敏期(8-12週)	99	13	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0
比較過敏期(13-16週)	87	15	13	1	2	1	1	0	1	0	1	1
小計	250	40	33	1	3	1	1	0	3	0	1	1
妊娠中期(16-28週)	277	57	28	2	7	4	2	0	2	0	0	0
妊娠後期(29週-)	250	37	16	4	4	3	1	1	2	0	1	0
不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
合計	778	134	77	7	14	8	4	1	7	0	3	1