

表5 抗インフルエンザ薬投与例でのその他の奇形とその他の異常の内訳

投与薬剤	イベント発生時期	その他の奇形とその他の異常	集計用_新生児異常の詳細
タミフル	相対的過敏期	その他の異常	早産(36w4d)、呼吸障害
			低出生体重児(39w1d 2394g)、網膜出血
			嘔吐
			鼠径ヘルニア
			高ビリルビン血症
	比較的過敏期	その他の異常	一過性多呼吸 敗血症うたがい
			早産・低出生体重児(36w0d 2424g)、低血糖
			早産・低出生体重児(31w1d 1794g)、白質軟化症
			高ビリルビン血症
			微熱
	妊娠中期	その他の奇形 その他の異常	両耳ろう孔
			IUGR、低出生体重児(39w3d 2124g)、高ビリルビン血症
			早産・極低出生体重児(31w4d 1398g)、胎便イレウス、高ビリルビン血症
			高ビリルビン血症
			高ビリルビン血症
			高ビリルビン血症
高ビリルビン血症			
新生児感染症			
新生児感染症			
新生児感染症			
妊娠後期	その他の異常	低血糖	
		低出生体重児(38w2d 2494g)、皮下腫瘍	
		水泡性のう胞	
		低出生体重児(37w1d 2272g)、難聴	
		顔貌異常 チアノーゼ 両多合指症	
	その他の奇形	口蓋裂	
		IUGR、低出生体重児(37w2d 2205g)、心内膜床欠損症、多指症	
		早産・低出生体重児(34w0d 2352g)、呼吸障害、高ビリルビン血症、血小板減少 (2万/mm ³)	
		聴力障害	
		一過性呼吸障害(チアノーゼ SPO2 90)	
	その他の奇形	発熱(37.8~38℃)	
		二分脊椎	
		けいれん 脳梁欠損	
		水頭症 クルーゾン病	
		早産・低出生体重児(24w3d 662g)、新生児呼吸窮迫症候群	
リレンザ	妊娠中期	その他の異常	低血糖、早産児・低出生体重児(33w0d 2244g)
	妊娠後期	その他の異常	左副腎腫瘍 高ビリルビン血症
抗インフルエンザ薬以外の薬剤のみ	妊娠中期	その他の異常	早産、一過性多呼吸、高ビリルビン血症(36w5d) 先天性股関節脱臼
	妊娠後期	その他の異常	IUGR(37w4d 2276g、羊水混濁、胎便吸引症候群(MAS)) 低出生体重児 RSウイルス感染 双胎第1子、早産児(35w6d 2230g) 低出生体重児、RSウイルス感染 双胎第2子、早産児(35w6d 2176g)