

表4 タミフル投与症例の児の異常との関連性

| 妊娠初期 | 児の異常 | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | 今回の調査 | 林らの調査 ¹⁾ | 総計 |
| 無影響期(0~27日)(0-3週) | 0 | 0/20 | 0/20 |
| 絶対過敏期(28~50日)(4-7週) | 3/14 (流産2例(ともに妊娠6週)、早産(妊娠36週)1例) | 2/43(VSD 1例, 流産1例) | 5/57 (VSD1例、流産3例 早産1例) |
| 相対過敏期(51~84日)(8-12週) | 1/13 (新生児黄疸(軽度)) | 0/2 | 1/15(新生児黄疸1例) |
| 比較過敏期(85~112日)(13-16週) | 4/15 (早産(妊娠32週)1例, 新生児仮死2例、微熱1例) | 0/0 | 4/15 (早産1例、微熱1例 新生児仮死2例) |
| 小計 | 8/42 | 2/65 | 10/107 |
| 妊娠中期(16-28週) *(妊娠中期は14週以降とすることがあるが、ここでは比較的過敏期以降の16週とした) | 8/60 (転帰不明2例含む) | VSD 1例 顔貌異常、両側多合指症1例 黄疸2例 低血糖1例 早産(妊娠36週)1例 皮下腫瘤1例 | 0 8/60 |
| 妊娠後期(29週-) | 1/44 (聴力検査再調査1例) | | 1/44 |
| 服用時期不明 | 0/3 | | 0/3 |
| 総計 | 17/149 | 2/65 | 19/214 |

(¹⁾ 林昌洋 他 日病薬誌 45:547-550, 2009)