

周産期登録（PERINAT）2025年分娩以降の登録項目一覧

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
1	0			症例登録番号	—	テキスト	
2	0			新規登録日	—	日付	
3	0			新規登録者	—	テキスト	
4	0			最終更新日	—	日付	
5	0			最終更新者	—	テキスト	
6	0			登録施設名	—	テキスト	
7	0			施設コード	—	テキスト	
9	0		基本情報	年	必須	整数	
10	0		基本情報	整理番号	必須	整数	
11	0		基本情報	母生年月日	任意	日付	
12	0		基本情報	母入院番号	任意	テキスト	
13	0		基本情報	児入院番号	任意	テキスト	
14	0		基本情報	入院理由	必須	複数選択	陣痛発来 PROM 管理目的 手術 その他
15	0		基本情報	不妊治療	必須	単一選択	なし あり
16	1	選択項目にホルモ ン補充周期を追加	基本情報	不妊治療（詳細）	不妊治療が「あり」の場合、必須	複数選択	☐ 排卵誘発剤 ☐ ホルモン補充周期 ☐ AIH ☐ IVF-ET(○媒精,○顕微授精,○不明 ☐ その他(☐ 胚盤胞移植, ☐ 卵子提供)
17	1	顕微授精漢字修正	基本情報	不妊治療（IVF-ET）	不妊治療で「IVF-ET」を選択した場合、必須	単一選択	媒精 顕微授精 不明
18	0		基本情報	不妊治療（その他）	不妊治療で「その他」を選択した場合、必須	複数選択	胚盤胞移植 卵子提供
19	2	新規	基本情報	着床前・出生前遺伝学的検査	必須	複数選択	☐ なし ☐ 不明 ☐ PGT-A ☐ PGT-M ☐ PGT-SR ☐ NIPT ☐ コンバインド ☐ 血清マーカー ☐ 絨毛(☐ 染色体, ☐ 遺伝子, ☐ その他) ☐ 羊水(☐ 染色体, ☐ 遺伝子, ☐ その他) ☐ その他(_____)
20	2	新規	基本情報	絨毛検査（詳細）	着床前・出生前遺伝学的検査で「絨毛」を選択した場合、必須	複数選択	染色体 遺伝子 その他
21	2	新規	基本情報	羊水検査（詳細）	着床前・出生前遺伝学的検査で「羊水」を選択した場合、必須	複数選択	染色体 遺伝子 その他
22	2	新規	基本情報	着床前・出生前遺伝学的検査（その他）	着床前・出生前遺伝学的検査で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
23	0		基本情報	母体紹介	必須	単一選択	なし あり
24	0		基本情報	母体紹介（理由）	母体紹介が「あり」の場合、必須	複数選択	外来紹介 帰省分娩 搬送あり(○緊急,○非緊急) 病診連携（セミオープン）

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
25	0		基本情報	母体紹介（搬送あり）	母体紹介（理由）で「搬送あり」を選択した場合、必須	単一選択	非緊急 緊急
26	0		基本情報	妊娠回数（今回を含む）	必須	整数	
27	0		基本情報	分娩回数（今回を含まない）	必須	整数	
28	0		基本情報	早産	必須	整数	
29	0		基本情報	帝王切開	必須	整数	
30	0		基本情報	自然流産	任意	整数	
31	0		基本情報	人工妊娠中絶	任意	整数	
32	0		基本情報	母身長	任意	整数	
33	0		基本情報	非妊時体重	任意	整数	
34	0		基本情報	分娩時体重	任意	整数	
35	1	必須選択化	基本情報	喫煙	必須	単一選択	なし 妊娠前あり（妊娠中無し） 妊娠中あり 不明
36	1	必須選択化	基本情報	妊娠中飲酒	必須	単一選択	なし 機会飲酒のみ （ほぼ）毎日 不明
37	1	選択項目変更、必須選択化	基本情報	パートナー喫煙	必須	単一選択	なし あり 不明
38	1	選択項目変更、必須選択化	基本情報	パートナー飲酒	必須	単一選択	なし あり 不明
39	0		分娩	分娩(年月日)	必須	日付	
40	0		分娩	分娩(時)	必須	整数	
41	0		分娩	分娩(分)	必須	整数	
42	0		分娩	妊娠(週)	必須	整数	22-44
43	0		分娩	妊娠(日)	必須	整数	0-6
44	0		分娩	分娩時年齢	必須	整数	10-70
45	0		分娩	分娩方法	必須	単一選択	自然経膣 吸引 鉗子 予定帝切 緊急帝切（通常） 緊急帝切（超）
46	0		分娩	分娩胎位	必須	単一選択	頭位 骨盤位 その他
47	1	選択項目変更、必須選択化	分娩	無痛分娩	必須	単一選択	○なし ○あり（□硬膜外麻酔,□脊髄クモ膜下麻酔,□その他: (____)）
47	1	選択項目変更、必須選択化	分娩	無痛分娩（あり）	無痛分娩で「あり」を選択した場合、必須	複数選択	□硬膜外麻酔,□脊髄クモ膜下麻酔,□その他: (____)
48	2	新規	分娩	無痛分娩（その他）	無痛分娩で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
49	1	選択項目変更	分娩	TOLAC	任意	単一選択	なし あり
50	1	フォーマット変更、必須選択化	分娩	帝王切開の適応	分娩方法で「予定帝切,緊急帝切（通常）,緊急帝切（超）」のいずれかを選択した場合必須	複数選択	□胎児機能不全 □既往帝王切開 □胎位異常 □分娩停止 □子宮手術後 □その他:(_____)
51	2	新規	分娩	帝王切開の適応（その他）	帝王切開の適応で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
52	1	必須選択化	分娩	帝王切開の麻酔	分娩方法で「予定帝切,緊急帝切（通常）,緊急帝切（超）」のいずれかを選択した場合必須	複数選択	☐ 脊髄クモ膜下麻酔 ☐ 硬膜外麻酔 ☐ 全身麻酔 ☐ その他: ()
53	2	新規	分娩	帝王切開の麻酔（その他）	帝王切開の麻酔で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
54	1	選択項目変更	分娩	子宮切開法	任意	単一選択	横切開 縦切開 その他: ()
54	2	新規	分娩	子宮切開法(その他)	子宮切開法で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
55	0		分娩	分娩時出血量	必須	整数	
56	1	選択項目変更	分娩	誘導・陣痛促進	必須	複数選択	☐ なし ☐ オキシトシン ☐ PGF2α ☐ その他: ()
56	2	新規	分娩	誘導・陣痛促進(その他)	誘導・陣痛促進で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
57	0		分娩	頸管熟化拡張処置	必須	複数選択	☐ なし ☐ メトロロ(≦40ml) ☐ メトロロ(>40ml) ☐ 吸湿性頸管拡張剤 ☐ PGE2内服 ☐ PGE2腔剤 ☐ その他: ()
58	0		分娩	頸管熟化拡張処置（その他）	頸管熟化拡張処置で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
59	0		分娩	胎児心拍数波形レベル分類	任意	単一選択	1 2 3 4 5 不明
60	0		分娩	基線細変動	任意	単一選択	正常 減少 消失 増加
61	0		分娩	一過性徐脈・基線異常	任意	複数選択	LD(○軽度,○高度) VD(○軽度,○高度) PD(○軽度,○高度) 持続性頻脈 持続性徐脈 Sinusoidal
62	0		分娩	一過性徐脈・基線異常（LD）	任意	単一選択	軽度 高度
63	0		分娩	一過性徐脈・基線異常（VD）	任意	単一選択	軽度 高度
64	0		分娩	一過性徐脈・基線異常（PD）	任意	単一選択	軽度 高度
65	0		合併症	産科合併症	必須	単一選択	なし あり

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
66	1	頸管長短縮を 頸管短縮へ変 更 SGA、CAOSの 2項目を選択肢 に追加	合併症	産科合併症（詳細）	産科合併症が 「あり」の場 合、必須	複数選択	☐ 切迫流産【 ☐ 22週未満の性器出血】⇒【（詳細： ☐ 出血なし ☐ 12週未満 ☐ 12-15週 ☐ 16-22週未満）】 ☐ 切迫早産 ☐ 頸管無力症 ☐ 頸管短縮 ☐ 腔内胎胞脱出 ☐ 頸管縫縮術（○予防的,○治療的） ☐ 重症妊娠悪阻 ☐ DVT ☐ 貧血 ☐ GDM ☐ Overt DM ☐ HDP(詳細：____,○Eo,○Lo,)(診断時週数) ☐ 子癇 ☐ SGA ☐ FGR (発症時期(○32週未満 ○32週以降)) ☐ 血液型不適合 ☐ 早産前期破水(____週) ☐ 臨床的CAM ☐ 低置胎盤 ☐ 前置胎盤(☐ 全, ☐ 部分, ☐ 辺縁) ☐ 癒着胎盤 ☐ 胎盤遺残 ☐ 常位胎盤早期剥離(☐ 持続的収縮, ☐ 板状硬, ☐ 胎児機能不全, ☐ IUFD, ☐ 胎盤後血腫) ☐ HELLP症候群 ☐ 脳出血 ☐ 急性妊娠性脂肪肝 ☐ 弛緩出血 ☐ 羊水塞栓(○古典型（心肺虚脱型）,○子宮型) ☐ 肺塞栓 ☐ 肺水腫 ☐ 産科危機的出血 ☐ 産科DIC ☐ 回旋異常 ☐ 遷延分娩 ☐ 分娩停止 ☐ CPD ☐ 微弱陣痛 ☐ 過強陣痛 ☐ 子宮破裂 ☐ 頸管裂傷 ☐ 羊水過多 ☐ 羊水過少 ☐ CAOS ☐ 臍帯脱出 ☐ 臍帯下垂 ☐ 産褥熱 ☐ 周産期心筋症 ☐ その他:(_____)
67			合併症	切迫流産（22週未満の性器出血）		単一選択	☐ 22週未満の性器出血
67	1	フォーマット、 選択項目 変更	合併症	切迫流産（22週未満の性器出血） (詳細)	産科合併症（詳細）で「切迫流産」を選択した場合、必須	複数選択	☐ 出血なし ☐ 12週未満 ☐ 12-15週 ☐ 16-22週未満
68	0		合併症	頸管縫縮術（詳細）	産科合併症（詳細）で「頸管縫縮術」を選択した場合、必須	単一選択	予防的 治療的
69	0		合併症	HDP（詳細）	産科合併症（詳細）で「HDP」を選択した場合、必須	単一選択	妊娠高血圧腎症(PE) 妊娠高血圧症(GH) 高血圧合併妊娠(CH) 加重型妊娠高血圧腎症(SPE)
70	0		合併症	HDP（内容）	産科合併症（詳細）で「HDP」を選択した場合、必須	単一選択	Eo Lo

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
71	0		合併症	HDP診断時週数	産科合併症（詳細）で「HDP」を選択した場合、必須	単一選択	4-44、不明
72	2	新規	合併症	FGR（発症診断時期）	産科合併症（詳細）で「FGR」を選択した場合、必須	単一選択	32週未満 32週以降
73	1	選択項目変更・追加	合併症	早産期前期破水（週）	産科合併症（詳細）で「早産期前期破水」を選択した場合、必須	単一選択	12-44、12週未満、不明
74	0		合併症	前置胎盤（所見）	産科合併症（詳細）で「前置胎盤」を選択した場合、必須	複数選択	全 部分 辺縁
75	0		合併症	常位胎盤早期剥離（所見）	産科合併症（詳細）で「常位胎盤早期剥離」を選択した場合、必須	複数選択	持続的収縮 板状硬 胎児機能不全 IUFD 胎盤後血腫
76	0		合併症	羊水塞栓	産科合併症（詳細）で「羊水塞栓」を選択した場合、必須	単一選択	古典型（心肺虚脱型） 子宮型
77	0		合併症	産科DIC（スコア）	産科合併症（詳細）で「産科DIC」を選択した場合、必須	整数	
78	0		合併症	産科合併症（その他）	産科合併症で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
79	0		処置	母処置	必須	単一選択	なし あり
80	1	その他自由記載枠追加	処置	母処置（詳細）	母処置が「あり」の場合、必須	複数選択	☐ 酸素投与 ☐ 胎盤用手剥離 ☐ 血腫除去(☐ 腔壁, ☐ 会陰) ☐ 子宮摘出 ☐ 輸血(☐ 自己血, ☐ 同種血) ☐ 子宮双手圧迫 ☐ 会陰切開 ☐ 産道裂傷・縫合(☐ 頸管, ☐ 腔壁) ☐ 会陰裂傷・縫合(☐ 3度, ☐ 4度) ☐ 子宮弛緩処置(☐ ニトログリセリン, ☐ 吸入麻酔, ☐ リトドリン, ☐ その他:() ☐ バルーンタンポナーデ ☐ 動脈塞栓術 ☐ compression suture ☐ 死戦期帝王切開 ☐ その他:()
81	0		処置	血腫除去（詳細）	母処置で「血腫除去」を選択した場合、必須	複数選択	腔壁 会陰
82	0		処置	輸血（種類）	母処置で「輸血」を選択した場合、必須	複数選択	自己血 同種血
83	0		処置	産道裂傷・縫合（詳細）	母処置で「産道裂傷・縫合」を選択した場合、必須	複数選択	頸管 腔壁
84	0		処置	会陰裂傷・縫合（詳細）	母処置で「会陰裂傷・縫合」を選択した場合、必須	複数選択	3度 4度
85	1	その他自由記載枠追加	処置	子宮弛緩処置（詳細）	母処置で「子宮弛緩処置」を選択した場合、必須	複数選択	☐ ニトログリセリン ☐ 吸入麻酔 ☐ リトドリン ☐ その他:()

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
85	2	新規	処置	子宮弛緩処置（詳細）（その他）	子宮弛緩処置（詳細）で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
86	0		処置	母処置（その他）	母処置（詳細）で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
87	0		処置	母転帰	必須	単一選択	生 死 転科
88	0		処置	母死亡（日）	母転帰が「死」の場合、必須	日付	
89	0		処置	母死亡（時）	母転帰が「死」の場合、必須	整数	
90	0		処置	母死亡（分）	母転帰が「死」の場合、必須	整数	
91	0		処置	母死因	母転帰が「死」の場合、必須	テキスト	
92	0		児	胎数	必須	単一選択	1 2 3 4 5
93	0		児	多胎の場合の順位	任意	整数	
94	1	選択方式変更	児	双胎の種類	任意	単一選択	DD MD MM 不明
95	0		児	出産体重	必須	数値	
96	0		児	性別	必須	単一選択	男 女 不明
97	0		児	身長	必須	整数	
98	0		児	頭囲	必須	整数	
99	0		児	APGAR 1分	必須	整数	
100	0		児	APGAR 5分	必須	整数	
101	0		児	臍帯動脈血pH	任意	数値	
102	0		児	転帰	必須	単一選択	生 死
103	0		児	転帰（NICU）	必須	複数選択	NICU入院
104	0		児	診断	任意	複数選択	☐ 形態異常（詳細： ） ☐ 胎児水腫 ☐ 新生児仮死 ☐ LFD:SGA ☐ HFD:LGA ☐ TTTS受血児 ☐ TTTS供血児 ☐ その他:()
105	0		児	診断（形態異常：詳細）	診断（形態異常）を選択した場合、必須	テキスト	
106	0		児	診断（他）	診断で「他」を選択した場合、必須	テキスト	
107	0		児	入院施設名	任意	テキスト	
108	0		児	入院施設（分娩施設）	任意	複数選択	分娩施設

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
109	1	選択項目変更	児	蘇生術	必須	複数選択	☐ なし ☐ 酸素 ☐ マスク・バッグ ☐ ラリングアルマスク ☐ 胸骨圧迫 ☐ 気管挿管 ☐ 不明 ☐ その他（_____）
109	2	新規	児	蘇生術（その他）	蘇生術で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
110	0		児	その他の処置	任意	テキスト	
111	0		胎児付属物	胎盤重量	任意	整数	
112	0		胎児付属物	臍帯長	任意	整数	
113	1	選択項目変更	胎児付属物	羊水混濁	任意	単一選択	なし あり
114	1	選択項目変更	胎児付属物	単一臍帯動脈	任意	単一選択	なし あり
115	0		胎児付属物	臍帯付着異常	任意	複数選択	辺縁 卵膜 その他
116	0		胎児付属物	臍帯血管吻合	任意	複数選択	AA VV AV 未確認
117	1	選択項目変更	胎児付属物	胎盤病理提出	必須	単一選択	なし あり
118	1	選択項目変更	胎児付属物	Blanc分類	任意	複数選択	☐ 1度 ☐ 2度 ☐ 3度 ☐ 不明
119	1	選択項目変更	胎児付属物	臍帯炎	任意	複数選択	☐ 1度 ☐ 2度 ☐ 3度 ☐ 不明
120	2	新規	胎児付属物	びまん性絨毛膜羊膜ヘモジデロシス（DCH）	任意	単一選択	☐ なし ☐ あり
121	0		胎児付属物	その他所見	任意	テキスト	
122	0		胎児付属物	妊娠分娩コメント	任意	テキスト	
123	0		既往歴	母体産科既往症（今回を含まない）	必須	単一選択	なし あり
124	0		既往歴	既往症（詳細）	母体産科既往症で「あり」の場合、必須	複数選択	（早剥以外の）妊娠中の性器出血 自然早産 切迫流産 切迫早産（子宮収縮） 切迫早産（頸管長短縮） 頸管無力症（子宮収縮なし） 頸管裂傷 頸部非切除術（蒸散等） 頸部切除術（ ☐ LEEP, ☐ conization） HDP（詳細：_____, ☐ Eo, ☐ Lo） 常位胎盤早期剥離 前置胎盤 pPROM 生殖期感染症 死産 FGR 糖尿病 GDM Overt DM その他：（_____）
125	0		既往歴	頸部切除術（詳細）	既往症（詳細）で「頸部切除術」を選択した場合、必須	複数選択	LEEP conization
126	0		既往歴	HDP（詳細）	既往症（詳細）で「HDP」を選択した場合、必須	単一選択	妊娠高血圧腎症(PE) 妊娠高血圧症(GH) 高血圧合併妊娠(CH) 加重型妊娠高血圧腎症(SPE)

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
127	0		既往歴	HDP（内容）	既往症（詳細） で「HDP」を選 択した場合、必 須	単一選択	Es Lo
128	0		既往歴	既往症（その他）	既往症（詳細） で「その他」を選 択した場合、必 須	テキスト	
129	0		基礎疾患	母体基礎疾患（今回の妊娠中）	必須	単一選択	なし あり
130	1	選択肢項目変更：「子宮腺筋症・内膜症」を「子宮腺筋症」と「子宮内膜症」に分離。「腺筋症核出術」を追加。	基礎疾患	基礎疾患（詳細）	母体基礎疾患で 「あり」の場 合、必須	複数選択	☐中枢神経系(含む脳血管疾患) ☐呼吸器(肺炎・気管支炎) ☐消化器(☐虫垂炎,☐胃腸炎,☐炎症性腸疾患) ☐肝(肝炎) ☐腎・泌尿器(☐尿路感染症,☐尿路結石,☐慢性腎炎,☐その他（　　）) ☐血液 ☐心血管 ☐甲状腺(☐機能亢進症,☐機能低下症,☐潜在性機能低下症) ☐骨 ☐筋肉 ☐子宮奇形 ☐子宮筋腫 ☐子宮腺筋症 ☐子宮内膜症 ☐子宮頸部異形成 ☐子宮(その他)(　　) ☐付属器 ☐外傷・中毒 ☐精神疾患 ☐自己免疫疾患 ☐本態性高血圧症 ☐深部静脈血栓症 ☐悪性腫瘍(　　) ☐子宮筋腫核出術(☐開腹,☐腹腔鏡) ☐腺筋症核出術(☐開腹,☐腹腔鏡) ☐DM(☐1型,☐2型,☐不明) ☐歯科疾患(歯周病含む) ☐その他:(_____)
131	0		基礎疾患	消化器（詳細）	基礎疾患（詳細）で「消化器」を選択した場合、必須	複数選択	虫垂炎 胃腸炎 炎症性腸疾患
132	1	その他自由記載枠追加	基礎疾患	腎・泌尿器（詳細）	基礎疾患（詳細）で「腎・泌尿器」を選択した場合、必須	複数選択	尿路感染症 尿路結石 慢性腎炎 その他：(_____)
132	2	新規	基礎疾患	腎・泌尿器（詳細）（その他）	腎・泌尿器（詳細）で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
133	0		基礎疾患	甲状腺（詳細）	基礎疾患（詳細）で「甲状腺」を選択した場合、必須	複数選択	機能亢進症 機能低下症 潜在性機能低下症
134	0		基礎疾患	子宮（その他）	基礎疾患（詳細）で「子宮（その他）」を選択した場合、必須	テキスト	
135	0		基礎疾患	悪性腫瘍（詳細）	基礎疾患（詳細）で「悪性腫瘍」を選択した場合、必須	テキスト	
136	0		基礎疾患	子宮筋腫核出術（詳細）	基礎疾患（詳細）で「子宮筋腫核出術」を選択した場合、必須	複数選択	開腹 腹腔鏡
136	2	新規	基礎疾患	腺筋症核出術（詳細）	基礎疾患（詳細）で「腺筋症核出術」を選択した場合、必須	複数選択	開腹 腹腔鏡

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
137	0		基礎疾患	DM（詳細）	基礎疾患（詳細）で「DM」を選択した場合、必須	複数選択	1型 2型 不明
138	0		基礎疾患	基礎疾患（その他）	基礎疾患（詳細）で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
139	0		感染症	母体感染症	必須	単一選択	なし あり
140	1	選択項目名称 変更・追加	感染症	母体感染症（詳細）	母体感染症が「あり」の場合、必須	複数選択	☐ GBS ☐ クラミジア(初感染) ☐ 梅毒 ☐ HBsキャリア ☐ HCVキャリア ☐ 風疹IgM ☐ トキソプラズマ(初感染) ☐ サイトメガロ(初感染) ☐ HTLV-1キャリア ☐ HIV ☐ バルボB19 ☐ 細菌性膣症(Nugent≧7点) ☐ インフルエンザ（A、B、 不明 ） ☐ 劇症型A群溶連菌感染症 ☐ 麻疹(初感染) ☐ 新型コロナウイルス感染症 ☐ その他(____)
141	1	選択項目変更	感染症	インフルエンザ（詳細）	母体感染症（詳細）で「インフルエンザ」を選択した場合、必須	単一選択	A B 不明
142	0		感染症	母体感染症（その他）	母体感染症（詳細）で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
143	0		使用薬剤	母体使用薬剤	必須	単一選択	なし あり
144	1	選択項目名称 変更・追加	使用薬剤	使用薬剤（詳細）	母体使用薬剤が「あり」の場合、必須	複数選択	☐ 胎児移行目的ステロイド ☐ リトドリン塩酸塩(☐ 点滴, ☐ 経口) ☐ 硫酸マグネシウム(☐ 早産予防, ☐ 子癇予防) ☐ Caブロッカー(☐ 子宮収縮抑制, ☐ 降圧) ☐ インドメサシン ☐ プロゲステロン(早産予防目的)(☐ 膣錠, ☐ 筋注) ☐ ウリナスタチン ☐ 低用量アスピリン ☐ ヘパリン ☐ インスリン ☐ 甲状腺機能改善薬(☐ MMI, ☐ PTU, ☐ 甲状腺ホルモン剤, ☐ その他(____)) ☐ 抗Dヒト免疫グロブリン(☐ 妊娠中, ☐ 産褥) ☐ 向精神薬(☐ 抗精神病薬, ☐ 抗不安薬, ☐ 抗うつ薬, ☐ その他:(____)) ☐ 抗菌剤(☐ 点滴, ☐ 経口, ☐ 膣錠) ☐ フィブリノゲン製剤 ☐ RSウイルスワクチン ☐ その他:(____)
145	0		使用薬剤	ステロイド投与回数	使用薬剤（詳細）で「胎児移行目的ステロイド」を選択した場合、必須	単一選択	1クール 2クール その他
146	0		使用薬剤	ステロイド投与～娩出までの時間	使用薬剤（詳細）で「胎児移行目的ステロイド」を選択した場合、必須	単一選択	～48時間 48時間～7日 7日～1ヶ月 1ヶ月
147	0		使用薬剤	ステロイド種類	使用薬剤（詳細）で「胎児移行目的ステロイド」を選択した場合、必須	複数選択	ベタメサゾン デキサメサゾン その他

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
148	0		使用薬剤	ステロイド総投与量	使用薬剤（詳細）で「胎児移行目的ステロイド」を選択した場合、必須	整数	
149	1	項目名称変更	使用薬剤	リトドリン塩酸塩（方法）	使用薬剤（詳細）で「リトドリン塩酸塩」を選択した場合、必須	複数選択	点滴 経口
150	0		使用薬剤	硫酸マグネシウム（目的）	使用薬剤（詳細）で「硫酸マグネシウム」を選択した場合、必須	複数選択	早産予防 子癇予防
151	0		使用薬剤	Caブロッカー（方法）	使用薬剤（詳細）で「Caブロッカー」を選択した場合、必須	複数選択	子宮収縮抑制 降圧
152	0		使用薬剤	プロゲステロン（早産予防目的）の詳細	使用薬剤（詳細）で「プロゲステロン（早産予防目的）」を選択した場合、必須	複数選択	腔錠 筋注
153	0		使用薬剤	甲状腺機能改善薬（種類）	使用薬剤（詳細）で「甲状腺機能改善薬」を選択した場合、必須	複数選択	MMI PTU 甲状腺ホルモン剤 その他（_____）
153	2	新規	使用薬剤	甲状腺機能改善薬（その他）	母体使用薬剤（詳細）甲状腺機能改善薬で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
154	0		使用薬剤	抗Dヒト免疫グロブリン（投与時期）	使用薬剤（詳細）で「抗Dヒト免疫グロブリン」を選択した場合、必須	複数選択	妊娠中 産褥
155	1	選択項目変更	使用薬剤	向精神薬（種類）	使用薬剤（詳細）で「向精神薬」を選択した場合、必須	複数選択	抗精神病薬 抗不安薬 抗うつ薬 その他:(_____)
156	0		使用薬剤	抗菌剤（方法）	使用薬剤（詳細）で「抗菌剤」を選択した場合、必須	複数選択	点滴 経口 腔錠
157	0		使用薬剤	母体使用薬剤（その他）	母体使用薬剤（詳細）で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	
158	0		胎児治療	胎児治療の有無	必須	単一選択	なし あり
159	0		胎児治療	胎児治療（詳細）	胎児治療の有無が「あり」の場合、必須	複数選択	☐ 胎児鏡下レーザー手術 ☐ 胎児シャント術 ☐ その他:(_____)
160	0		胎児治療	胎児治療（その他）	胎児治療で「その他」を選択した場合、必須	テキスト	

NO	変更フラグ (なし=0、 変更あり =1、新規 追加=2、 削除=3)	変更事項	分類カテゴリ	フィールド名	必須／任意	フォーマット	2025年選択肢項目（最終）
161	0		児死亡	臨床死因分類	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	単一選択	(1) 妊娠高血圧症候群 (2) 母体疾患 (3) 前置胎盤 (4) 常位胎盤早期剥離 (5) その他の胎盤異常 (6) 臍帯の異常 (7) 胎位・胎勢・回旋の異常 (8) 以上に含まれない新生児呼吸障害 (9) 以上に含まれない胎児・新生児低酸素症 (10) 以上に含まれない胎児・新生児損傷 (11) 以上に含まれない低出産体重 (12) 形態異常 (13) 胎児・新生児の溶血性疾患 (14) 周産期の感染 (15) 多胎妊娠・双胎間輸血症候群 (16) 非免疫性胎児水腫 (17) その他・不明
162	0		児死亡	死因	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	テキスト	
163	0		児死亡	剖検	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	単一選択	なし あり
164	0		児死亡	剖検所見	「剖検あり」が 選択されている 場合必須	テキスト	
165	0		児死亡	死亡時期	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	単一選択	死産 早期新生児死亡 後期新生児死亡
166	0		児死亡	死亡日	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	日付	
167	0		児死亡	死亡日時（時）	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	整数	
168	0		児死亡	死亡日時（分）	児の「転帰」が 「死」の場合、 必須	整数	
169	3	削除	児死亡	児診断・処置		複数選択	すべて削除します
170	2	新規	その他	コメント	任意	テキスト	