## 「OC・LEP ガイドライン 2020 年度版」の読者各位

内容に誤記がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

公益社団法人 日本産科婦人科学会 一般社団法人 日本女性医学学会

## CQ501 VTE リスクの説明は? P.64 26 行目

誤	正
その結果、VTE <u>の</u> ハザード比は周期的 OC	その結果、VTE ハザード比は周期的 OC <u>に</u>
<u>の 1.32(95%CI, 1.07~1.64)</u> に比較して、	比較して、延長/連続的 OC が 1.32(95%CI,
延長/連続的 OC が 1.84 (95%CI,1.53~	1.07~1.64) と高値であった。
<u>2.21)</u> と高値であった。	

## CQ701 服用禁忌の説明は? P.104 表 2WHO 適格基準

1. 記載カテゴリーの変更

カテゴリー3-利益を上回るリスク 12 行目

「抗レトロウイルス療法-Ritonavir-boosted protease inhibitors 削除」

誤	正
OC が処方できない場合	OC が処方できる場合
カテゴリー3-利益を上回るリスク	カテゴリー2-リスクを上回る利益

## 2. 文中の修正

OC が処方できる場合

カテゴリー2-リスクを上回る利益 7行目

誤	正
妊娠時の高血圧歴(現在の <u>高血圧</u> は正常)	妊娠時の高血圧歴(現在の血圧は正常)