

令和4年1月14日

厚生労働省健康局

健康局長 佐原 康之 様

予防接種室長 鶴田 真也 様

公益社団法人 日本産科婦人科学会

理事長 木村 正

公益社団法人 日本産婦人科医会

会長 木下勝之

## 妊婦に対する新型コロナワクチン3回目接種の優先接種についての要望

平素、産婦人科に関わるワクチン事業に関して格別のご高配を賜り、深く感謝申し上げます。

本学会では、これまでに妊婦への新型コロナワクチン接種に関して3回の通知を一般の皆様に向けて発出し、妊婦への新型コロナウイルス（メッセンジャーRNA）ワクチンの接種を推奨してまいりました。

本学会の周産期委員会が実施した妊婦約6500人への調査では、令和3年11月時点で、約80%の妊婦が新型コロナワクチンを1回以上接種しています（資料1）。日本国内の妊婦の新型コロナワクチンに対する意識が高いことが窺われます。

一方で、令和4年1月からのオミクロン株を中心とする新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今後の新型コロナウイルス感染妊婦の増加が危惧されます。

以下に示す必要性を考慮しますと、可及的速やかに妊婦への新型コロナワクチンの3回目接種を行うことが推奨されます。

妊婦への3回目接種の優先的接種をご検討いただきたく、お願い申し上げます。

①新型コロナウイルス感染妊婦の重症化（資料2）

②新型コロナウイルス感染妊婦の受け入れ産科医療機関の逼迫のリスク（資料3）

③オミクロン株感染妊婦に関する母体重症化、周産期異常、母子感染の情報不足

④既に多くの妊婦が新型コロナワクチンを2回接種されていること（資料1）

(参考資料)

(1) 妊婦の新型コロナウイルス接種に関する WEB アンケート調査、日本産科婦人科学会周産期委員会、R 4.1.12 発行

[https://www.jsog.or.jp/news/pdf/2022\\_COVID19\\_questionnaire\\_research.pdf](https://www.jsog.or.jp/news/pdf/2022_COVID19_questionnaire_research.pdf)

(2) Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al., Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis, *BMJ* 2020;370:m3320 | doi: 10.1136/bmj.m3320

(3) Takaoka M, Umazume T, Watari H., Importance to release of the number of pregnant women with COVID-19 to help build the perinatal medical care system in Japan, *J Obstet Gynaecol Res.* 2021, 47(11):4127-4128. doi: 10.1111/jog.15002.

以上